

LA PLAGA DE LA PAPALLONA DEL BOIX

Frenem la seva propagació

Cydalima perspectalis. Espècie invasora d'origen asiàtic, primers exemplars trobats al 2014 a Besalú, Garrotxa.


L'eruga d'aquest insecte s'alimenta de les fulles i de l'escorça dels boixos de jardins i boscos.

Provoca el desfullatge extrem que danya la planta. No és perjudicial per les persones

Si les desfoliacions són contínues provoquen la mort de la planta.

AFECTACIÓ 2020

- NUL
- LLEU
- MODERAT
- GREU
- SEVER




Font: Observatori Forestal

Exemple de boixeda desfoliada



Font: Govern.cat

Cicle Biològic



Com podem col·laborar ?


1. Detectar boixedes desfullades i informar a ALERTA FORESTAL. Contacte via:



2. ALERTA FORESTAL analitza l'estat de salut actual dels boscos catalans. [Enllaç per descarregar la APP.](#)

3. Detectar l'espècie entre les fulles dels boixos amb l'entrada del bon temps. Les erugues hi mengen i les papallones hi ponen ous. S'hi pot aplicar tractament fitosanitari de producte biològic *Bacillus thuringiensis* varietat kurstaki, fàcil de trobar en una botiga especialitzada.

4. Podar les branques mortes dels boixos pot ajudar a eliminar erugues en fase d'hivernació.



Contribuim a conservar la verdor del planeta

Com la podem identificar?



Papallona: Color marró fosc al cap i al tòrax. Ales de color blanc i contorn amb tonalitats marrons i negres. Longitud: Entre 2,6 i 4 cm.



Eruga: Cap negre, tonalitats grogues i verdes, línies blanques en el dors, amb una franja predominant fosca. Longitud entre 3,5 i 4 cm.